

beaphar**Lactol** Puppy Milk - Lait

(NL) Voor toelichting over de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, bereidingswijze en mengverhouding: Zie buitenverpakking.

(F) **Conseils de préparation et quantités à diluer :** Voir les recommandations sur la boîte.

Vanaf de geboorte
Dès la naissance

+
DHA

347101
a NL/90856

(NL) Moederloze puppy's - complete voeding

Gewicht puppy (g)	Max. dagelijkse hoeveelheid melk (ml)	Leeftijd dagen	Aantal voedingen per dag
250	100	2-14	6-8 (iedere 3-4 uur, ook 's nachts)
500	160	15-21	6 (iedere 4 uur, ook 's nachts)
1000	250	22-28	6 (incl. 1x 's nachts)
2000	400	29-35*	4-6
5000	900	36-42	2-6
		43-49	0-3

* Na 28 dagen, langzaam overschakelen op vaste voeding.

Bijvoeren van puppy's - aanvullende voeding volwassen honden:

Tot de leeftijd van 8 weken kan Lactol Puppy Milk gegeven worden als aanvullende voeding, tot 40ml per kg lichaamsgewicht per dag. Voor pups vanaf 8 weken en voor volwassen drachtige, zogende, zieke of herstellende honden, tot 11ml per kg lichaamsgewicht per dag.

(F) Aliment complet pour les chiots non-sevrés

Poids (g)	Quantité maximale de Lactol par jour (ml)	Âge en jours	Nombre de repas par jour
250	100	2-14	6-8 (toutes les 3-4 heures, y compris pendant la nuit)
500	160	15-21	6 (toutes les 4 heures, y compris pendant la nuit)
1000	250	22-28	6 (avec un repas pendant la nuit)
2000	400	29-35*	4-6
5000	900	36-42	2-6
		43-49	0-3

* À partir de 28 jours, passer progressivement à une alimentation solide.

Aliment complémentaire pour les chiots en sevrage, les femelles gestantes ou allaitantes et les chiens malades ou en convalescence :

- Pour les chiots âgés de moins de 8 semaines : Administrer 40 ml de lait dilué par kg de poids corporel.
- Pour les chiots de plus de 8 semaines, les femelles gestantes et allaitantes et les chiens malades ou en convalescence: Donner 11 ml de de lait dilué par kg de poids corporel.

beaphar**Lactol** Muttermilch ErsatzFrom birth
Von Geburt an+
DHA

GB For further explanation on the recommended daily dosage, mixing instructions and dilution:

See outer packaging.

D Weitere Informationen zur empfohlenen täglichen Fütterungsmenge, Hinweise für die richtige Anwendung und Mischverhältnis:

Siehe äußere Verpackung.

GB Unweaned puppies - complete diet			
Weight (g)	Maximum volume of Lactol per day (ml)	Age in days	Feeds per day
250	100	2-14	6-8 (every 3-4 hours including through the night)
500	160	15-21	6 (every 4 hours including through the night)
1000	250	22-28	6 (including once during the night)
2000	400	29-35*	4-6
5000	900	36-42	2-6
		43-49	0-3

* After 28 days, slowly change to a more solid diet.

Weaned puppies - complementary feed:

Below 8 weeks of age, Lactol can be given as a complementary feed use up to 40ml per kg bodyweight. For adult animals when pregnant, lactating or convalescing up to 11ml Lactol per kg of bodyweight can be given as a complementary feed.

D Fütterungsempfehlung für mutterlose Welpen - Alleinfuttermittel			
Gewicht des Welpen (g)	max. trinkfertige Milch pro Tag (ml)	Alter des Welpen in Tagen	Anzahl der Mahlzeiten pro Tag
bis 250	100	2-14	6-8 (alle 3-4 Std., auch nachts)
bis 500	160	15-21	6 (alle 4 Std., auch nachts)
bis 1.000	250	22-28	6 (1x in der Nacht)
bis 2.000	400	29-35*	4-6
bis 5.000	900	36-42	2-6
		43-49	0-3

* Nach 28 Tagen allmählich zu fester Nahrung übergehen.

Fütterungsempfehlung für die Zufütterung von Welpen: Bis zur 8. Lebenswoche kann beaphar Lactol auch als Ergänzungsfuttermittel, mit bis zu 40 ml trinkfertiger Welpen-Milch pro kg Körpergewicht am Tag, verabreicht werden.

Fütterungsempfehlung für trächtige und säugende Hündinnen sowie stark beanspruchte und ältere Hunde: Bis zu 11 ml trinkfertige Milch pro kg Körpergewicht am Tag.