

# Lactolyte®

## OPLOSBAAR POEDER

### ■ NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDE

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :

VIRBAC - L.I.D. - 1ère Avenue - 2065 m - 06516 CARROS (FRANKRIJK)

### ■ BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

LACTOLYTE, oplosbaar poeder

### ■ GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Voor een zakje van 90 g :

Lactoserumpoeder.....	76.88 g
Natriumacetaat watervrij .....	4.90 g
Natriumpropionate watervrij .....	1.92 g
Natriumchloride watervrij .....	2.92 g
Kaliumchloride watervrij .....	0.74 g
Magnesiumchloride watervrij .....	0.38 g
Monokaliumfosfaat watervrij .....	1.36 g

Hulpstof : Kopra-olie.

### ■ INDICATIES

LACTOLYTE, oplosbaar poeder is bestemd voor de behandeling van dehydratie, acidose en verlies van elektrolyten als gevolg van diarree bij kalveren.

Aanvullende behandeling op een intraveneuze rehydratietherapie.

### ■ CONTRA-INDICATIES : Geen bekend.

### ■ BIJWERKINGEN : Geen bekend.

### ■ DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen (Kalveren)

### ■ DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Per dier : 90 g LACTOLYTE, oplosbaar poeder oplossen in 2 liter water van ongeveer 38°C (wat overeenkomt met een zakje van 90 g of 4 maatlepels).

Tweemaal per dag 2 liter drank geven, gedurende 2 of 3 dagen, zonder enige andere melkvoeding. De drank moet vlak voor de toediening worden bereid. Niet verbruikte resten weggieteren.

### ■ WACHTTIJD : (Orgaan)vlees : 0 dagen.

### ■ SPECIALE VOORZORG SMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25 °C.

Wanneer de drank is bereid, dient deze onmiddellijk te worden toegediend.

### ■ SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Oplossingen met elekrolyten dienen niet tegelijk met sulfonamides te worden toegediend.

### ■ SPECIALE VOORZORG SMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELLEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

### ■ DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN : 09/2012.

### ■ OVERIGE INFORMATIE

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht. Vrij.

## Lactolyte®, Poudre soluble

### ■ NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : VIRBAC - L.I.D. - 1ère Avenue - 2065 m - 06516 CARROS (FRANCE)

### ■ DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

LACTOLYTE, poudre soluble

### ■ LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS

Pour un sachet de 90 g :

Poudre de lactosérum.....	76.88 g
Acétate de sodium anhydre .....	4.90 g
Propionate de sodium anhydre .....	1.92 g
Chlorure de sodium anhydre .....	2.92 g
Chlorure de potassium anhydre .....	0.74 g
Chlorure de magnésium anhydre .....	0.38 g
Phosphate monopotassique anhydre.....	1.36 g

Excipient : Huile de coprah.

### ■ INDICATIONS

LACTOLYTE, poudre soluble est indiqué pour le traitement des déshydratations, acidoses et perte d'électrolytes associées avec les diarrhées chez les veaux. Traitement complémentaire de la réhydratation par voie intraveineuse.

### ■ CONTRE-INDICATIONS : Aucune connue.

■ **EFFETS INDÉSIRABLES :** Aucun connu.

■ **ESPÈCES CIBLES :** Bovins (Veaux)

■ **POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Pour un animal : diluer 90 g de LACTOLYTE, poudre soluble dans 2 litres d'eau à environ 38°C (soit un sachet de 90 g ou 4 mesurettes). Administrer 2 litres de buvée 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours en supprimant toute alimentation lactée. La buvée doit être préparée juste avant son administration. Jeter les quantités non consommées.

■ **TEMPS D'ATTENTE :** Viande et abats : 0 jour

■ **CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas conserver à des températures supérieures à 25°C.

Une fois reconstituée, la buvée doit être administrée immédiatement.

■ **MISES EN GARDE PARTICULIÈRES**

Des solutions en électrolytes ne sont pas compatibles avec des sulfonamides.

■ **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

■ **DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE :** 09/2012.

■ **INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Vente libre.

## Lactolyte<sup>®</sup>, LÖSLICHES PULVER

■ **NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber : VIRBAC - L.I.D. - 1ère Avenue - 2065 m - 06516 CARROS (FRANKREICH)

■ **BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS :** LACTOLYTE, lösliches Pulver

■ **WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 Beutel mit 90g enthält :

Lactoserumpulver.....	76.88 g
Natriumacetat, anhydrat .....	4.90 g
Natriumpropionat, anhydrat .....	1.92 g
Natriumchlorid, anhydrat .....	2.92 g
Kaliumchlorid, anhydrat .....	0.74 g
Magnesiumchlorid, anhydrat .....	0.38 g
Monokaliumphosphat, anhydrat .....	1.36 g

**Sonstige Bestandteile :** Kopräöl

■ **ANWENDUNGSGEBIETE**

LACTOLYTE, lösliches Pulver zur Behandlung von Dehydratation, Azidose und Elektrolytmangel in Verbindung mit Durchfall bei Kälbern. Ergänzende Behandlung zur intravenösen Rehydratation.

■ **GEGENANZEIGEN :** Keine bekannt.

■ **NEBENWIRKUNGEN :** Keine bekannt.

■ **ZIELTIERARTEN :** Rinder (Kälber).

■ **DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Für ein Tier: 90g LACTOLYTE, lösliches Pulver in 2 Liter Wasser von ca. 38°C lösen (1 Beutel bzw. 4 Dosierlöffel). Täglich, an 2-3 aufeinanderfolgenden Tagen, 2 Mal 2 Liter als Tränkwasser verabreichen. Während der Behandlung darf keine Milch oder Milchaustauscher verabreicht werden. Die Trinkmischung soll sofort nach Herstellung verabreicht werden. Restmengen sind zu vernichten.

■ **WARZEIT**

Essbare Gewebe und Schlachtabfälle : 0 Tage.

■ **BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern. Nach Herstellung soll die Trinkmischung sofort verabreicht werden.

■ **BESONDERE WARNHINWEISE**

Unverträglichkeit von Elektrolytlösungen mit Sulfonamiden.

■ **BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH :** Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

■ **GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE :** 09/2012.

■ **WEITERE ANGABEN**

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht. Frei verkäuflich.

■ **DISTRIBUTEUR / VERTRIEB**

Virbac Belgium - B - 3001 Leuven

BE-V169583