

À quelle fréquence devez-vous vermifuger votre CHIEN ?

Chien vivant à l'intérieur

Le chien vit exclusivement à l'intérieur ou a un accès très limité à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contact direct avec d'autres chiens et n'a pas accès aux parcs ni aux jardins. Le chien ne mange pas de viande crue et/ou ne consomme pas de limaces, d'escargots ou de proies.

Le chien a un accès régulier à l'extérieur

Le chien sort régulièrement, peut souvent se déplacer librement sans surveillance et a un contact direct avec d'autres chiens. Il présente un comportement de chasse et/ou une tendance accrue à manger des proies, des déchets d'abattage ou reçoit de la viande crue comme alimentation.

Le chien a tendance à manger des escargots ou entre en contact avec eux et/ou mange de l'herbe.



Nee



Nee

Ja

Groupe A

Vermifuger 1 à 2 fois par an contre les ascaris ou selon les résultats d'un examen des selles.

Groupe B

Vermifuger 4 fois par an contre les ascaris ou selon les résultats d'un examen des selles.

Groupe C

Traiter 4 à 12 fois par an contre les ascaris et les vers pulmonaires ou selon les résultats d'un examen des selles.

Traiter 4 à 12 fois par an contre les ténias.

Groupe D

Traiter 4 à 12 fois par an contre les ascaris et les vers pulmonaires ou selon les résultats d'un examen des selles.

Traiter 12 fois par an contre les ténias.

Mesures préventives

- Si des segments de ténia sont observés autour de l'anus ou dans les selles, il faut également vermifuger le chien contre les ténias avec du praziquantel et commencer un traitement contre les puces.
- Faire examiner régulièrement les selles de votre chien est une bonne alternative aux recommandations de vermifugation.
- Mesures d'hygiène importantes pour les personnes et les animaux
 - 1: Lavez-vous bien les mains (surtout celles des enfants), en particulier avant de manger.
 2. Lavez soigneusement les fruits et les légumes avant leur consommation.
 3. Ne donnez pas de viande crue à votre chien. Assurez-vous qu'il ait toujours de l'eau fraîche à disposition.
 4. Couvrez les bacs à sable lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
 5. Ramassez immédiatement les déjections de votre chien, que ce soit dans le jardin ou lors des promenades, et jetez-les dans la poubelle des ordures ménagères, jamais sur le compost ! Lavez-vous les mains ensuite.

Traitement complémentaire

Traitement contre les ascaris :

- Les chiots doivent être vermifugés dès l'âge de 2 semaines, le traitement étant répété toutes les 2 semaines jusqu'à 2 semaines après le sevrage. En cas de risque d'infection élevé et persistant (par exemple dans les groupes de jeux pour chiots), un traitement mensuel est recommandé jusqu'à l'âge de six mois.
- Vermifugez la chienne allaitante lors du premier traitement des chiots (2 semaines après la naissance).
- Pour réduire la transmission aux chiots, les femelles gestantes peuvent recevoir des lactones macrocycliques (par exemple Milbémycine) autour du 40^e et du 55^e jour de gestation, ou du fenbendazole quotidiennement à partir du 40^e jour de gestation jusqu'au 2^e jour après la mise bas.
- Les chiens présentant un risque accru d'infection (sport, exposition, concours, chenil) doivent être traités deux fois, au maximum 2 semaines avant et 2 semaines après l'événement. Dans les chenils, un traitement mensuel est recommandé ou basé sur les résultats d'un examen mensuel des selles.
- Les chiens de travail (thérapie, secours, police) doivent, selon le schéma décisionnel, être vermifugés chaque mois ou, si l'exposition au ténia du renard est faible, traités selon les résultats d'un examen mensuel des selles.

- Les chiens vivant avec de jeunes enfants (de moins de 5 à 6 ans), des personnes immunodéprimées ou âgées (YOPI) doivent, selon le schéma décisionnel, être vermifugés chaque mois, ou faire l'objet d'un examen mensuel des selles et être traités en fonction des résultats.

Traitement contre le ver pulmonaire / ver du cœur français

- Les chiens qui ont tendance à manger des escargots et/ou des limaces et de l'herbe doivent, selon le schéma décisionnel, par exemple en fonction de la fréquence d'ingestion d'escargots/limaces et du niveau de contamination de l'environnement, être traités préventivement chaque mois.

Traitement contre les ténias

- Les chiens qui voyagent ou sont importés dans des zones où le ténia du renard est présent doivent être traités 4 semaines après le début du voyage, puis chaque mois jusqu'à 4 semaines après leur retour. Après importation, il faut vermifuger immédiatement.

- Pour les chiens qui consomment de la viande crue, des déchets d'abattage ou des proies, ou qui chassent, il est recommandé de les vermifuger toutes les 4 semaines, ou en fonction des résultats d'un examen des selles effectué tous les 2 à 3 mois.

- Vermifuger en cas d'infestation par les puces.

- Vermifuger lorsqu'une infection par le ténia est détectée.

Traitement contre le ver du cœur

- Les chiens vivant dans des zones où le ver du cœur est présent doivent recevoir un traitement préventif mensuel contre les larves pendant la saison des moustiques, jusqu'à 30 jours après la fin de celle-ci.

Voyages et transport

- Les chiens qui voyagent ou sont importés dans des régions où le ver du cœur est présent doivent être traités au plus tard 30 jours après le départ, puis chaque mois jusqu'à 30 jours après leur retour.

- Pendant la saison des moustiques, il faut traiter dans les 30 jours suivant l'arrivée, puis poursuivre le traitement mensuellement jusqu'à 30 jours après le retour à la maison.

- Importation depuis des régions où le ver du cœur est présent Traiter immédiatement après l'importation. Tester la présence de vers du cœur au moment de l'entrée et refaire un test après 6 mois.

Pour plus de conseils véto sur le vermifuge, veuillez visiter :

<https://www.medpets.fr/vermifuges/>



Les différentes espèces de vers

Les vers sont des parasites qui peuvent vivre sur différents endroits du corps de l'animal. Les chiens et les chats peuvent être infectés à tout moment, même par des vers qui peuvent présenter un risque aux humains. Les espèces de vers les plus importantes sont : les ascaris, les ankylostomes, les ténias (dont les vers adultes vivent dans l'intestin grêle), les vers du cœur (qui vivent dans les artères pulmonaires) et les vers du poumon (se situant dans les vaisseaux sanguins). Certains vers présentent un risque pour la santé humaine.

Les ascaris

Les ascaris sont les vers les plus fréquents chez les chiens et les chats. Ils appartiennent au groupe des vers ronds. Leur nom est dû à leur section transversale ronde. Les ascaris se trouvent dans les intestins, les voies respiratoires, sous la peau, sur les yeux, dans les sinus paranasaux et dans les gros vaisseaux du cœur. Les ascaris se trouvent en Europe.

Les vers du cœur

Dirofilaria immitis, plus communément appelé « ver du cœur » peut infecter les chiens et les chats. Le ver est ainsi nommé car il se trouve dans les vaisseaux sanguins pulmonaires du cœur. Ce ver est surtout présent au sud de l'Europe.

Les ténias

Les ténias ont un cycle de vie indirect. Les adultes vivent dans les intestins de l'hôte définitif (chien ou chat, par exemple). Les jeunes ténias se trouvant dans les hôtes intermédiaires (moutons, puces, lapins ou souris) se transfèrent vers le chien lorsque celui-ci consomme une partie du hôte intermédiaire. Le jeune ténia s'installe donc dans le tractus gastro-intestinal du chien. Il se développe et devient adulte. Chez l'hôte définitif, le ténia ne provoque généralement pas de problèmes majeurs. Les ténias se trouvent en Europe.

Vers du poumon

Angiostrongylus vasorum (ver du poumon)

Le *angiostrongylus vasorum*, plus connu sous le nom de ver du poumon, infecte les chiens. Il vit dans les vaisseaux situés entre le cœur et les poumons, d'où son nom. On l'appelle également ver pulmonaire car l'infection peut entraîner de graves lésions pulmonaires. Les chiens peuvent être infectés lorsqu'ils mangent des limaces ou des animaux de proie porteurs de ce ver. Les vers du poumon se trouvent en Europe.

Ver pulmonaire

En plus du ver du cœur français, il existe également un véritable ver pulmonaire chez le chien, appelé *Oslerus osleri*. Ce parasite forme des nodules dans les voies respiratoires supérieures des chiens et provoque des symptômes tels qu'une toux sèche, une toux lors d'un effort ou en cas de variations de température, ainsi que des difficultés respiratoires, une perte de poids et une diminution de l'appétit chez les jeunes chiens. Les chiens s'infectent en mangeant les excréments de chiens contaminés.

Pour plus de conseils véto sur le vermifuge,
veuillez visiter :
<https://www.medpets.fr/vermifuges/>

