

À quelle fréquence devez-vous vermifuger votre CHAT ?

Chats d'intérieur

Faible risque d'infection par les vers, car aucun rongeur n'est consommé.



Groupe A

Vermifuger 1 à 2 fois par an sur la base des résultats d'un examen des selles, ou de façon préventive 1 à 2 fois par an contre les ascaris.

Chats d'extérieur

Risque élevé d'infection par les vers en raison de la consommation de rongeurs.



Groupe B

Traiter 4 à 12 fois par an contre les ascaris ou selon les résultats d'un examen des selles.

Traiter 4 à 12 fois par an contre les ténias.

Mesures préventives

- Si des segments de ténia sont observés autour de l'anus ou dans les selles, il faut également vermifuger le chat contre les ténias avec du praziquantel et commencer un traitement contre les puces.
- Faire examiner régulièrement les selles de votre chat est une bonne alternative aux recommandations de vermifugation « standard ».
- Mesures d'hygiène importantes pour les personnes et les animaux :
 1. Lavez-vous bien les mains (surtout celles des enfants), en particulier avant de manger.
 2. Lavez soigneusement les fruits et les légumes avant leur consommation.
 3. Ne donnez pas de viande crue. Assurez-vous que votre chat dispose toujours d'eau fraîche.
 4. Couvrez les bacs à sable lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
 5. Ramassez immédiatement les déjections de votre chien, que ce soit dans le jardin ou lors des promenades, et jetez-les dans la poubelle des ordures ménagères, jamais sur le compost ! Lavez-vous les mains ensuite.

Traitement complémentaire

Traitement contre les ascaris :

- Les chatons doivent être vermifugés à l'âge de 3 semaines, le traitement étant répété toutes les 2 semaines jusqu'à 2 semaines après le sevrage. En cas de risque d'infection élevé et persistant (par exemple en cas de liberté à l'extérieur), un traitement mensuel est recommandé jusqu'à l'âge de six mois.
- Vermifugez la chatte allaitante lors du premier traitement des chatons (3 semaines après la naissance).
- Les chats présentant un risque accru d'infection (expositions, chatteries, refuges) doivent être traités deux fois, soit 2 semaines avant et 2 à 4 semaines après l'événement. Pour les chatteries : vermifuger chaque mois ou selon les résultats d'un examen mensuel des selles.
- Les chattes gestantes doivent être vermifugées une fois avec une solution spot-on à base d'émodepside (Dronspot) 7 jours avant la mise bas prévue afin de prévenir la transmission des larves de Toxocara cati par le lait aux chatons.

- Les chats vivant avec de jeunes enfants (moins de 5-6 ans), des personnes immunodéprimées ou âgées (YOPI) doivent, selon le schéma décisionnel, être vermifugés chaque mois ou faire l'objet d'un examen mensuel des selles, avec un traitement basé sur les résultats.

Traitement contre les ténias :

- Vermifuger en cas d'infestation par les puces.
- Vermifuger lorsqu'une infection par le ténia est détectée.
- Les chats qui consomment de la viande crue, des proies et/ou des déchets d'abattage, ou qui chassent, doivent être vermifugés au moins 4 fois par an ou selon les résultats d'un examen des selles effectué tous les 4 mois.
- Dans les régions où le ténia du renard est présent, les chats qui mangent des rongeurs peuvent excréter des œufs infectieux présentant un risque pour l'être humain. Cependant, comparé aux chiens, le risque d'excrétion d'œufs est nettement plus faible chez les chats. Pour réduire le risque résiduel à zéro, une fréquence de traitement plus élevée peut être appliquée. Des traitements mensuels (12 fois par an) empêchent l'excrétion d'œufs.

Traitement contre le ver pulmonaire :

- Dans les régions où le ver pulmonaire est présent, ou pour les chats qui sortent, mangent des escargots ou chassent, un traitement préventif tous les 2 mois est recommandé.

Traitement contre le ver du cœur :

- Les chats vivant dans des régions où le ver du cœur est présent doivent recevoir un traitement préventif mensuel contre les larves pendant la saison des moustiques et jusqu'à 30 jours après la fin de celle-ci.
- Les chats qui voyagent dans des zones où le ver du cœur est présent doivent être traités dans les 30 jours suivant leur arrivée, puis chaque mois jusqu'à 30 jours après leur retour.
- Les chats importés de régions où le ver du cœur est présent doivent être traités immédiatement après l'importation. Ils doivent ensuite être testés pour une éventuelle infection existante par le ver du cœur et retestés après au moins 6 mois.

Pour plus de conseils véto sur le vermifuge, veuillez visiter :
<https://www.medpets.fr/vermifuges/>



Les différentes espèces de vers

Les vers sont des parasites qui peuvent vivre sur différents endroits du corps de l'animal. Les chiens et les chats peuvent être infectés à tout moment, même par des vers qui peuvent présenter un risque aux humains. Les espèces de vers les plus importantes sont : les ascaris, les ankylostomes, les ténias (dont les vers adultes vivent dans l'intestin grêle), les vers du cœur (qui vivent dans les artères pulmonaires) et les vers du poumon (se situant dans les vaisseaux sanguins). Certains vers présentent un risque pour la santé humaine.

Les ascaris

Les ascaris sont les vers les plus fréquents chez les chiens et les chats. Ils appartiennent au groupe des vers ronds. Leur nom est dû à leur section transversale ronde. Les ascaris se trouvent dans les intestins, les voies respiratoires, sous la peau, sur les yeux, dans les sinus paranasaux et dans les gros vaisseaux du cœur. Les ascaris se trouvent en Europe.

Les vers du cœur

Dirofilaria immitis, plus communément appelé « ver du cœur » peut infecter les chiens et les chats. Le ver est ainsi nommé car il se trouve dans les vaisseaux sanguins pulmonaires du cœur. Ce ver est surtout présent au sud de l'Europe.

Les ténias

Les ténias ont un cycle de vie indirect. Les adultes vivent dans les intestins de l'hôte définitif (chien ou chat, par exemple). Les jeunes ténias se trouvant dans les hôtes intermédiaires (moutons, puces, lapins ou souris) se transfèrent vers le chien lorsque celui-ci consomme une partie du hôte intermédiaire. Le jeune ténia s'installe donc dans le tractus gastro-intestinal du chien. Il se développe et devient adulte. Chez l'hôte définitif, le ténia ne provoque généralement pas de problèmes majeurs. Les ténias se trouvent en Europe.

Vers du poumon

Angiostrongylus vasorum (ver du poumon)

Le *angiostrongylus vasorum*, plus connu sous le nom de ver du poumon, infecte les chiens. Il vit dans les vaisseaux situés entre le cœur et les poumons, d'où son nom. On l'appelle également ver pulmonaire car l'infection peut entraîner de graves lésions pulmonaires. Les chiens peuvent être infectés lorsqu'ils mangent des limaces ou des animaux de proie porteurs de ce ver. Les vers du poumon se trouvent en Europe.

Ver pulmonaire

Chez le chat, en plus du ver du cœur français, on trouve également le ver pulmonaire félin *Aelurostrongylus abstrusus*. Les symptômes tels que la toux, les difficultés respiratoires, la perte d'appétit et l'amaigrissement n'apparaissent qu'en cas d'infection sévère. Un chat peut être infecté par le ver pulmonaire en mangeant des escargots, des grenouilles, des souris, des oiseaux ou des reptiles.

Pour plus de conseils véto sur le vermifuge,
veuillez visiter :
<https://www.medpets.fr/vermifuges/>

